

Modulo 2


(B)

Sezione 1

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro

CENNI DI ANATOMIA DELLO SCHELETRO

- ✘ Lo scheletro è una struttura rigida che
 - ✘ sostiene e protegge il corpo umano
 - ✘ gli conferisce la forma caratteristica
 - ✘ consente alle sue varie componenti, connettendosi ai muscoli, di concorrere funzionalmente al movimento



COMPONENTI DELLO SCHELETRO



Lo scheletro è composto da

- × **ossa**, elementi duri e resistenti
- × **articolazioni**, specifici sistemi di raccordo e di snodo, che mettono fra loro in reciproco contatto le ossa

DISTORSIONI, LUSSAZIONI E FRATTURE

- Lesioni determinate da una forza particolarmente intensa sulle componenti ossee o/e articolari dello scheletro
- A seconda della componente interessata, sono distinti in:
 - ✓ distorsioni
 - ✓ lussazioni
 - ✓ fratture



Tipo di lesione

Definizione

Distorsione

Lesione di un'articolazione in cui un capo articolare, per un movimento forzato, esce temporaneamente dalla propria sede, danneggiando la capsula ed/o i legamenti.

Lussazione

Lesione di un'articolazione in cui un capo articolare, per un movimento forzato, esce dalla sede naturale **senza poterci rientrare**, compromettendo non solo capsula e legamenti, ma, a volte, anche vasi e nervi.

Segni comuni e distinti di distorsione e lussazione

Segni	Distorsione	Lussazione
Dolore	al movimento	costante, accentuato dal movimento
Tumefazione	limitata, prodotta da lesioni di capsula e legamenti e da eventuali versamenti intrarticolari	accentuata per l'azione del capo articolare che accentua le lesioni di capsula e legamenti ed i versamenti intrarticolari
Deformazione	da rigonfiamento articolare	da rigonfiamento articolare e da perdita degli usuali rapporti articolari
Mancata funzionalità	---- (assente) ----	per perdita del movimento e blocco articolare

DISTORSIONI E LUSSAZIONI

Primo soccorso

- ✘ considerare ogni caso dubbio come una frattura
- ✘ immobilizzare l'articolazione nella posizione assunta subito dopo il trauma
 - ✘ assecondando la *posizione antalgica* dell'infortunato
 - ✘ evitando manovre di riduzione dell'osso
 - ✘ steccando e fasciando l'arto, per controllare il dolore e limitare la formazione di ematomi
 - ✘ applicando del freddo (***ghiaccio pronto uso***)

FRATTURA

Definizione:

rottura di un osso che determina una interruzione parziale o totale della sua continuità.



**Frattura scomposta
della regione distale
di tibia e perone**

Classificazione per tipo di lesione

Denominazione	Tipo di lesione
Frattura (F) incompleta	parziale interruzione della continuità ossea
F. completa	interruzione dell'osso a tutto spessore in cui i monconi
• composta	➤ restano in sede fra loro incastrati
• scomposta	➤ si spostano dalla loro sede
F { chiusa	in cui la pelle sopra la lesione non è lesa, non consente all'osso, quindi, una comunicazione con l'esterno
	esposta
F comminuta	frantumazione dell'osso in più frammenti

SEGNI E SINTOMI

**Nella regione traumatizzata
compaiono:**

- ✓ **dolore vivo**, incrementato da ogni tentativo di movimento
- ✓ **gonfiore**
- ✓ **deformazione** rispetto all'altra parte del corpo
- ✓ **mancata funzionalità** della parte traumatizzata
- ✓ **scrosci, mobilità anomala**

FRATTURE

Primo soccorso

× Valutare

- la scena del soccorso e la dinamica del trauma
 - le condizioni generali del traumatizzato
- valutazione primaria
- × scoprire la parte lesa, tagliando i vestiti con le forbici come nella medicazione delle ferite
- valutazione secondaria
- × immobilizzare nella posizione in cui si trova la parte lesa utilizzando – se disponibili - strumenti di contenimento (**steccaggio**)
- controllo del dolore
- × **non** tentare manovre di riduzione per evitare il rischio di
 - lesioni vascolari e neurologiche
 - esposizione della ferita

ALCUNE REGOLE NELLO STECCAGGIO

Per dare stabilità allo steccaggio

- ✘ mettere imbottiture (ovatta) nello spazio fra stecche e pelle

Per tener fermi due monconi rotti

- bloccare le articolazioni a monte e a valle dei capi dell'osso con steccaggio



Immobilizzare il tratto traumatizzato nella posizione in cui si trova e bloccare le stecche con legature poste mai sull'area traumatizzata e sempre sopra e sotto ad essa

IMMOBILIZZAZIONI SENZA STECCHE

Nelle immobilizzazioni provvisorie degli arti, si può bloccare la parte traumatizzata con un'altra parte del corpo:

- una **gamba** può essere bloccata *steccandola* con l'altra sana
- un **braccio** può essere bloccato addossandolo al torace con una fasciatura adesiva
 - contenendolo nel triangolo di tela ancorato sulla spalla opposta, passante sotto il braccio opposto e pendente sul torace (*bloccaggio ad armacollo*)



FRATTURA ESPOSTA

Definizione: lesione traumatica in cui i frammenti ossei sono in comunicazione con l'esterno.

Attenzione!

Le fratture esposte possono complicarsi con emorragie incontrollabili, lesioni di nervi e vasi, contagio della ferita...

FRATTURE ESPOSTE

Primo Soccorso

Cosa non fare

- tamponare l'emorragia con una *compressione diretta*
- medicare la ferita e l'osso sporgente
- affondare sottocute i monconi ossei
- *steccare* la frattura esposta


Cosa fare

- chiamare il 118
- controllare l'emorragia con una *compressione a distanza*
- coprire la ferita ed il moncone sporgente con medicazione sterile

TRAUMI E LESIONI

CRANIO-ENCEFALICI E DELLA COLONNA VERTEBRALE

- Sono “traumi maggiori”
- Il primo soccorritore deve intervenire sui danni specifici soltanto se la vittima è stabile (cioè se non presenta alterazioni dei parametri vitali)



FASE DI VALUTAZIONE

- x della scena del soccorso
- x della dinamica del trauma
- x delle condizioni generali del traumatizzato

valutazione
primaria

118

- x dei danni specifici

valutazione
secondaria

L'ABCDE del traumatizzato

Valutazione primaria (ABC)

Valutazione	Azione
A. coscienza (<i>Airway</i>)	- valutazione della coscienza - (eventuale) apertura delle vie aeree
B. respiro (<i>Breathing</i>)	- (eventuale) sostegno del circolo e del respiro
C. circolazione (<i>Circulation</i>)	- se respira, contrasto delle emorragie, dello shock

L'ABCDE del traumatizzato

Valutazione secondaria (D)

Valutazione

Azione

D. Disfunzionalità
cerebrale/ Disability

Impiego schema
AVPU

Ricerca deficit delle
estremità

Fase D (*Disability*) dell'ABCDE

Valutazione dei deficit neurologici encefalici e midollari

Azione

- uso del sistema AVPU
- ricerca dei segni di danno spinale

<i>Alert</i>	<i>Verbal</i>	<i>Pain</i>	<i>Unresponsive</i>
Attento	risponde agli stimoli vocali	reagisce solo agli stimoli dolorosi	non risponde ad alcun stimolo



- **Arti superiori**


- sente, stringe, muove

- **Arti inferiori**

- sente, spinge, muove



probabile
assenza di
danno midollare



- **Arti superiori**

- sente, stringe, muove

- **Arti inferiori**

- non sente, non spinge, non muove



danno
midollare
inferiore



- **Arti superiori**

- non sente, non stringe, non muove

- **Arti inferiori**

- non sente, non spinge, non muove




danno
midollare
cervicale



L'ABCDE del traumatizzato

Valutazione secondaria (E) nel trauma cranico



Valutazione	Azione
E. Esposizione dell'area colpita per la ricerca di danni specifici	<ul style="list-style-type: none">• scoprire la regione traumatizzata per una più efficace individuazione del danno• proteggere dallo shock termico il traumatizzato<ul style="list-style-type: none">– coprendolo con una metallina

L'ABCDE del traumatizzato

Valutazione secondaria (E) nel trauma spinale



Valutazione

Azione

E. Esposizione dell'area colpita per la ricerca di danni specifici

- all'opposto della usuale procedura, non scoprire la regione traumatizzata per individuare il danno
 - rischio di danno midollare
- proteggere dallo **shock termico** il traumatizzato
 - coprendolo con una **metallina**

In caso di sospetto trauma spinale, non far mai all'fortunato

- ✘ NON flettere, estendere, ruotare la schiena
 - per farlo bere, vomitare, rialzare
- ✘ NON spostarlo dalla scena dell'infortunio, trascinandolo per le ascelle o le gambe, sollevandolo in braccio o in spalla
 - se è cosciente, invitarlo a rimanere fermo

TRAUMI E LESIONI toracico-addominali

TRAUMI DEL TORACE

Una delle conseguenze più gravi dei traumi del torace è la lesione delle costole e la formazione di una comunicazione tra torace ed esterno (*pneumotorace*)

TRAUMI DEL TORACE

Segni d'allarme

- aumento della frequenza respiratoria
- segni di probabile frattura costale
 - asimmetrie toraciche
 - riduzione delle escursioni
 - *movimenti paradossi* della parete (rientramento di una parte del costato in ispirazione - “*volet costale*”)
- perforazione toracica con
 - fuoriuscita di schiuma, liquido rossastro, accompagnato da un gorgoglio (“*ferita soffiante*”)

TRAUMI DEL TORACE: altri segni


- Dolore toracico
 - spontaneo nell'area traumatizzata del torace, accentuato dai movimenti respiratori
 - alla palpazione dell'area traumatizzata
- lesioni della parete toracica (ferita cutanea con aree circostanti di ecchimosi)

TRAUMI DEL TORACE

Primo Soccorso

Se si rilevano segni d'allarme da trauma grave, avvisare prioritariamente il 118, e poi

- coprire l'eventuale foro nella parete di una "*ferita soffiante*" con una compressa sterile e fissarla con un cerotto, lasciando aperto un lato
- sostenere con la propria mano il lato traumatizzato
- aiutare il pz. a trovare una posizione confortevole
 - la posizione semiseduta di solito è la migliore
- portare il braccio del lato colpito sulla parete toracica fasciandolo con un triangolo ("*fasciatura ad armacollo*")



FERITE GRAVI DELL'ADDOME

Un trauma a livello addominale produce lesioni di 2 tipi:

Ferite chiuse

Dovute a traumi contusivi, che provocano lacerazioni o rotture di organi o vasi contenuti in cavità

Ferite aperte

Dovute ad oggetti penetranti in parete o perforanti da parte a parte l'addome, che provocano lesioni più gravi dei traumi contusivi

SEGNI E SINTOMI DI TRAUMA ADDOMINALE

I segni e i sintomi principali sono:

- **il dolore addominale, accompagnato da**
 - nausea, vomito, tosse con emissione di sangue
 - segni iniziali di shock emorragico (sete, senso di spossatezza)
- **segni di lesione specifici dell'agente traumatico**
 - ecchimosi e lividi da contusione
 - lacerazioni, *ferite penetranti, fori d'entrata e d'uscita*

FERITE ADDOMINALI *CHIUSE*

Primo Soccorso

In sequenza ...


- allertare il **118** per trasferire rapidamente l'infortunato in ospedale
- ridurre il dolore, rilassando la parete addominale
 - sdraiare il traumatizzato e piegargli le gambe sulle cosce a ginocchia flesse
- non dargli da bere, anche se ha sete
- garantirgli l'apertura delle vie aeree in caso di vomito
- trattare lo shock, se insorge

FERITE ADDOMINALI APERTE

Primo Soccorso


In sequenza, come per le ferite chiuse,

- chiamare il **118**
- sdraiare il traumatizzato, piegandogli le gambe sulle cosce
- non dargli da bere, anche se ha sete
- se vomita, garantire pervietà vie aeree



E poi:

- coprire la breccia della parete con medicazione occlusiva
- tenere caldo l'addome, coprendolo



Sezione 2

*Acquisire conoscenze generali
sulle patologie specifiche
in ambiente di lavoro*

COLPO DI SOLE E DI CALORE

COLPO DI SOLE

Causa: esposizione

diretta al sole, con vaso dilatazione dei vasi cerebrali



- **Sintomi iniziali:** mal di testa violento, *fotofobia*, nausea, vomito, crampi, possibile svenimento
- **Altri sintomi:** rigidità nucale, allucinazioni e coma

COLPO DI SOLE

Primo Soccorso

Condotta la vittima in ambiente fresco, ventilato e poco illuminato o, almeno, al riparo dal sole

- sdraiarla e raffreddare la fronte con impacchi freddi (borsa del ghiaccio)
- se è cosciente, dargli da bere acqua
 - non dare da bere alcolici
- se perde coscienza
 - chiamare il 118
 - controllare le funzioni vitali e, se è necessario, sostenere respirazione e circolazione

COLPO DI CALORE

Per la **permanenza in ambienti particolarmente caldi** si produce un'eccessiva sudorazione che può dare un collasso ipotensivo

- **Sintomi e segni:** malessere con pelle fredda, pallida ed umida, ipotensione, nausea, vomito, svenimento

COLPO DI CALORE

Primo Soccorso

- **NON** dare da bere alcolici
- **NON** applicare il ghiaccio

NO

Condotta la vittima in un ambiente fresco, ventilato o, al riparo dal caldo

- sdraiarlo e coprirlo
- se è cosciente, dargli da bere acqua
- se perde coscienza
 - chiamare il 118
 - controllare le funzioni vitali
 - valutare e, se necessario, sostenere le funzioni vitali

SI

CONGELAMENTO E ASSIDERAMENTO

CONGELAMENTO

Lesione simile alle ustioni, localizzata alle estremità del corpo, per **esposizione diretta al freddo**.

- **Segni e sintomi di congelamento:**
 - **iniziali:** dolore della parte colpita (cute locale prima pallida e fredda, poi arrossata)
 - **avanzati:** vescicole prima, perdita locale della sensibilità dolorosa, poi vere e proprie aree necrotiche

SI

CONGELAMENTO

Primo soccorso

NO

- chiamare i soccorsi
- invitare il paziente a muovere l'arto colpito
- sdraiarlo
- rimuovere abiti e calzature strette
- coprire la parte con coperte
- tenere la vittima al caldo

- **non** applicare sulla parte fonti di calore
- **non** somministrare alcolici
- **non** rompere le bolle
- **non** frizionare la parte congelata con la neve

ASSIDERAMENTO

Condizione in cui l'**esposizione** dell'organismo **a basse temperature** determina un crollo della temperatura corporea sotto i 35 °C.

- **Segni e sintomi di assideramento:**

Ipotermia lieve: brividi, intorpidimento o sonnolenza

Ipotermia grave: rallentamento della respirazione e del battito cardiaco, con deficit visivo, incoordinazione motoria, sonnolenza

Ipotermia molto grave: perdita di coscienza, possibile arresto cardiaco e respiratorio

ASSIDERAMENTO

Primo Soccorso

- chiamare il 118
- porre la vittima al riparo dal freddo
- metterla in posizione sdraiata
- rimuovere gli indumenti bagnati
- coprirla con coperte e/o abiti asciutti
- non dare da bere alcolici
- valutare e sostenere le funzioni vitali
- **trattare la vittima con cautela, evitando movimenti bruschi**

- ✘ **Definizione:** lesione della pelle indotta da agenti di varia natura con energia lesiva superiore alle sue capacità difensive
- ✘ **Cause:** Le ustioni possono essere causate da 4 diversi tipi di **agenti** (*termico, chimico, elettrico, nucleare*) che sono attivati da differenti **fonti** e provocano distinte categorie di **danno**

Agenti termici

- frequenti cause di ustione; distinti in:
 - solidi arroventabili (utensili, manufatti...)
 - liquidi (olio, acqua bollenti)
 - gassosi (fiamma viva, vapore...)

Agenti chimici

- acidi e basi forti, solventi organici, ecc. a contatto con la cute
 - causano danni sulle superfici di contatto dei tessuti, chiamati **causticazioni**

Corrente elettrica

La corrente elettrica

- ✘ cede calore ai corpi che attraversa (*effetto Joule*)
- ✘ lascia nei punti di entrata e di uscita il cosiddetto *marchio elettrico*

Radiazioni

- componente ultravioletta della luce solare
- radiazioni non ionizzanti
- radiazioni ionizzanti

GRAVITÀ DELL'USTIONE

Criteri di valutazione

I parametri di valutazione della gravità di un'ustione sono:

- la profondità
- l'estensione
- altri fattori

Ustioni di 1° grado

- eritema e edema cutanei

Ustioni di 2° grado

- oltre a eritema e edema, presenza di *flittene* (bolle)




Ustioni di 3° grado

- **colorito bianco avorio** o **brunastro** delle lesioni, **consistenza molliccia** o **dura** dello spessore sottostante, perdita locale della sensibilità dolorosa

VALUTAZIONE DELL'ESTENSIONE

Per valutare l'estensione di un'ustione si usa la *regola del 9* (nell'adulto si divide il corpo in aree corrispondenti a multipli di 9)



VALUTAZIONE DI ALTRI FATTORI CRITICI

Altri *fattori critici* che condizionano l'evoluzione di un'ustione sono:

- fonte diversa da quella termica
- localizzazione del danno in *aree critiche*
- età del paziente
- preesistenza d'eventuali malattie

Valutazione della gravità

Grado	1° grado	< 50%
	2° grado	< 15%, se adulti
	3° grado	< 2% (escluso le <i>aree critiche</i>)
		Estensione

USTIONE MODERATA

Valutazione della gravità

In assenza di malattie preesistenti e senza l'interessamento di *aree critiche*

Grado	1° grado	tra il 50 ed il 75%
	2° grado	15-25%, se adulti
	3° grado	<10%

Estensione

USTIONE GRAVE

Grado	1° grado	>75% (per il rischio di malattia dell'ustionato)
	2° grado	>25%, se adulti
	3° grado	>10%

Estensione

Sono gravi, indipendentemente dalla profondità:

- le ustioni di 2° grado in *aree critiche*
- qualsiasi ustione complicata da malattie preesistenti, traumi, inalazione di fumi o gas tossici
- le ustioni da agenti chimici e da elettricità

USTIONI TERMICHE GRAVI: Primo Soccorso

Obiettivi del primo soccorso:

- ✘ minimizzare la perdita di liquidi (prevenzione dello *shock*)
- ✘ prevenire la contaminazione batterica della cute (causa poi di setticemia)

Cose da NON fare !

- non rimuovere gli abiti, se sono “appiccicati” alla pelle
- non bucare le *flittene*
- non utilizzare polveri né pomate
- non utilizzare acqua troppo fredda né ghiaccio nelle ustioni estese

USTIONI TERMICHE GRAVI

Primo Soccorso



Cose da fare

- ✘ verificare la sicurezza della scena
 - ✘ allontanare al più presto dalla fonte di calore soccorritore ed ustionato
- ✘ chiamare i soccorsi
- ✘ soffocare eventuali focolai accesi sul corpo con una coperta
- ✘ medicare le ferite (detergerle con soluzione fisiologica e coprirle con garze sterili)
- ✘ monitorare le funzioni vitali

USTIONI TERMICHE LOCALIZZATE

Primo Soccorso




Cose da fare:

- ✘ chiamare i soccorsi
- ✘ allontanare al più presto la fonte di calore
- ✘ raffreddare con acqua fredda
- ✘ medicare la cute ustionata

CAUSTICAZIONI

Primo Soccorso

- ✘ verificare la sicurezza della scena e chiamare i soccorsi specializzati
- ✘ **allontanare immediatamente l'agente chimico**
- ✘ coprire le zone di cute scoperta con garze sterili o teli puliti
- ✘ monitorare ed eventualmente sostenere le funzioni vitali della vittima



CAUSTICAZIONI DI CORNEA E CONGIUNTIVA

Segni e sintomi

- dolore intenso, gonfiore e rossore dell'occhio

Primo soccorso

- ✗ sciacquare immediatamente l'occhio
 - ✗ irrorare a lungo l'occhio con getti a bassa pressione (utilizzando la soluzione fisiologica)
 - ✗ tenere bene aperte le palpebre con le dita
- ✗ chiamare il 118

LESIONI DA ELETTRICITÀ

- ✘ eventi relativamente rari, ma con conseguenze spesso gravi
- ✘ colpiscono tutte le età, specialmente i soggetti in età lavorativa

EFFETTI DELLA CORRENTE

- × **Effetto termico:** riscaldamento del corpo
- × **Effetto chimico:** dissociazione chimica delle soluzioni elettrolitiche
- × **Effetto magnetico:** creazione di un campo magnetico intorno al corpo attraversato
- **Gli effetti sull'organismo vivente sono in relazione a:**
 - a) **resistenza del corpo umano**
 - b) **fattori fisici della corrente**
 - c) **altri fattori**

RESISTENZA DEL CORPO

- ✘ una volta venuta a contatto col corpo umano, la corrente percorre tutte le vie con minore resistenza e così in un baleno attraversa i tessuti
- ✘ il sangue è un ottimo conduttore, seguito dal tessuto muscolare e dagli altri organi
- ✘ il grasso e le ossa offrono una notevole resistenza al passaggio della corrente

Fattori fisici

× Tipo

- × corrente alternata più pericolosa di quella continua;
- × basse frequenze sono più pericolose rispetto alle alte

× Intensità

- × **Tensione** (correnti ad altissima tensione causano carbonizzazione)

Altri fattori

- modalità del contatto
- durata del passaggio
- via seguita attraverso il corpo



Il passaggio della corrente da un braccio all'altro è uno dei percorsi più pericolosi

MORTE DA FOLGORAZIONE



EFFETTI SUGLI ORGANI DELLA CORRENTE

Sul **cuore**:

- fibrillazione ventricolare
- arresto cardiaco

Sull'**apparato respiratorio**:

- paralisi dei muscoli intercostali e del diaframma
- ostruzione delle vie respiratorie per coma del folgorato

Sulla **pelle**:

- ustioni

PRIMO SOCCORSO

Tensioni < 1.000 V

- ✘ togliere la corrente
- ✘ se ciò non fosse possibile, staccare la vittima dall'elemento in tensione, isolandosi adeguatamente e senza toccarla direttamente
- ✘ valutare le funzioni vitali e se è il caso, sostenerle
- ✘ coprire le ferite da ustione con garze sterili e fasciarle

Tensioni > 1.000 V

- non avvicinarsi all'elemento in tensione prima di avere interrotto la corrente (arco voltaico!!!)
- soccorrere il folgorato, valutare le funzioni vitali e, se è il caso, sostenerle
- medicare le ustioni con garze sterili e coprirle con fasce

INTOSSICAZIONI

- ✘ Vie di penetrazione dei tossici nell'organismo:
 - ✘ ingestione (raro in azienda)
 - ✘ inalazione
 - ✘ contatto con la cute e le mucose
- ✘ I **segni di intossicazione** variano in base al tipo di sostanza e alla via di penetrazione
- ✘ I quadri clinici peggiorano in un tempo molto breve dall'avvelenamento

SEGNI E SINTOMI PIÙ COMUNI

Iniziali

- mancanza di forza e malessere
- mal di testa
- nausea e vomito
- crampi addominali

Altri segni

- capogiro e vertigine
- sonnolenza
- confusione mentale
- convulsioni

INTOSSICAZIONI

Primo Soccorso

In caso d'intossicazione

- consultare sempre le **SCHEDE TECNICHE E DI SICUREZZA** dei prodotti utilizzati

Il **primo soccorso** varia

- da sostanza a sostanza
- in base alla via di penetrazione

INTOSSICAZIONI

Primo Soccorso

Principi generali

- controllare le funzioni vitali e, se sono alterate, sostenerle
- individuare l'agente intossicante
- mettersi in contatto con Centro antiveleni
- rimuovere le sostanze tossiche / gli abiti contaminati

Per procedere ad un'eventuale RCP, pulire la cute contaminata ed utilizzare una *pocket mask*.

Incidente da ingestione: Primo Soccorso

- Oltre a quanto già indicato:
 - porre l'infortunato in posizione favorente l'emissione del tossico con il vomito
 - se il paziente ha ingerito un caustico, non favorire il vomito

Incidente da inalazione: Primo Soccorso

- Oltre a quanto già indicato:
 - allontanare il paziente dal pericolo portandolo in luogo aerato

INCIDENTE DA CONTATTO

Primo Soccorso

- allontanare il paziente dal pericolo
 - portandolo in luogo aerato
- chiamare immediatamente il Centro Antiveneni
- rimuovere gli abiti contaminati
- lavare abbondantemente con acqua la zona di cute contaminata

INCIDENTE DA CONTATTO CON AGENTI BIOLOGICI – Primo soccorso

Contaminazione di pelle e mucose

- rimuovere gli abiti contaminati
- lavare abbondantemente con acqua e sapone
- in caso di contaminazione delle mucose, sciacquare con acqua corrente e recarsi al pronto soccorso

Puntura con ago potenzialmente infetto


- far sanguinare la parte
- lavare abbondantemente con acqua
- disinfettare con un blando antisettico e recarsi al pronto soccorso

MORSO DI VIPERA

Il morso di vipera è raramente un evento mortale in quanto il veleno della vipera ha una azione piuttosto lenta e, molto spesso, è inoculato solo superficialmente

Cosa non fare

- praticare incisioni
- succhiare il sangue
- muovere il paziente
- dare da bere
- somministrare il siero antivipera



MORSO DI VIPERA

Primo soccorso

Cosa fare

- chiamare il **118**
- tranquillizzare e tenere ferma la vittima, cercando di evitare ogni movimento, specialmente della zona interessata
- attendere i soccorsi con vittima in posizione sdraiata
- fasciare con un bendaggio debolmente compressivo la zona interessata

CENTRI ANTIVELENI IN ITALIA

- ✘ Sono servizi di informazione tossicologica funzionanti 24 ore su 24
- ✘ Nel nostro Paese non sono istituzionalizzati
- **Informazioni da fornire al C. Antiveleni:**
 - natura dell'esposizione (inalazione, contatto cutaneo, ingestione)
 - durata dell'esposizione
 - nome della sostanza tossica

FERITE (cutanee e mucose)

Lesioni prodotte da traumi, che determinano la perdita dell'integrità di cute o mucose ed eventualmente dei tessuti sottostanti

TIPI DI FERITE

in base alla profondità del danno

□ si parla di

➤ quando il danno

- *ferite superficiali*

* si limita a cute e mucose

- *ferite profonde*

* investe i tessuti sottostanti

FERITA SUPERFICIALE

Primo soccorso

Il trattamento di una ferita superficiale si basa sulle seguenti fasi:

- **esposizione**
- **pulizia**
- **disinfezione**
- **medicazione**

**indossando
sempre i guanti!**

ESPOSIZIONE E PULIZIA

Indossati guanti, in sequenza sulla ferita si procede con:

- **esposizione:** scoprire subito la ferita

- **pulizia:** lavarla con acqua corrente (usare il sapone per rimuovere impurità)

Eventuali schegge non devono essere asportate per il pericolo di emorragie

DISINFEZIONE

- disinfettare soltanto con soluzione antisettica
 - non usare - per gli inconvenienti che determinano - ovatta, alcol, polvere antibiotica



MEDICAZIONE

- × **coprire** la ferita con garze o altro materiale sterile
 - per prevenire l'infezione
 - per arrestare l'emorragia
- × **fasciarla** con **bende** - non necessariamente sterili - per tenere a posto la medicazione



FASCIATURA DELLA FERITA

(Medicazione continua)

Oltre a proteggere la medicazione, favorendo la difesa contro le infezioni della ferita, la fasciatura potenzia l'**emostasi** della medicazione.



Se continua il sanguinamento:


- **non rimuovere la fasciatura già applicata**, ma
 - aggiungere un'altra fasciatura
 - sollevare l'arto
 - comprimere la ferita
 - applicare su di questa ghiaccio secco

MEDICAZIONE CON GARZE STERILI



FASCIATURA DI UNA FERITA SANGUINANTE

1



2



3



4



FERITE PROFONDE DELLE ESTREMITÀ

Primo soccorso

Una ferita profonda delle estremità richiede lo stesso trattamento di una ferita superficiale.

Se, però, si determina una lesione arteriosa (getto abbondante intermittente)

- ✓ occorre prioritariamente avviare il **trattamento dell'emorragia!**

FERITE PROFONDE DELLE ESTREMITÀ

Primo soccorso

- **chiamare il 118**, comunicando che è in atto un'emorragia arteriosa
- **proteggersi con mezzi barriera**
- sdraiare l'infortunato: **posizione antishock**
- **esporre la ferita scoprendola**
- **tamponare l'emorragia** (compressione diretta)
- utilizzare il laccio emostatico solo in caso di emorragia irrefrenabile

**Solo con l'emorragia sotto controllo,
pulire, disinfettare, medicare la ferita**

FERITE DA CORPO ESTRANEO DELL'OCCHIO

Primo soccorso

Corpo estraneo conficcato nell'occhio

1. indossare i guanti e far sedere la vittima, invitandola a non stropicciarsi l'occhio
2. non tentare di aprire le palpebre se il soggetto oppone resistenza
3. non tentare di rimuovere il corpo estraneo con manovre manuali
4. coprire l'occhio con una garza sterile
5. trasportare il ferito dallo specialista

FERITE DA CORPO ESTRANEO DELL'OCCHIO

Primo soccorso

Corpo estraneo libero nell'occhio

1. indossare i guanti e far sedere la vittima, invitandola a non stropicciarsi l'occhio
2. sollevare verso l'alto la palpebra superiore e verso il basso la palpebra inferiore, afferrandole per le ciglia, senza insistere
3. tentare di rimuovere il corpo estraneo con l'angolo di una garza
4. lavare l'occhio con acqua per 15' (pz sdraiato sul lato dell'occhio malato) versando acqua da 15 cm, a partenza dall'angolo interno dell'occhio
5. trasportare il ferito dallo specialista

AMPUTAZIONE

Il distacco di parti del corpo in seguito ad un evento traumatico può essere distinto...



Nella figura: esiti amputazione subtotale falange prossimale del secondo dito mano sinistra

<i>...in base a</i>	<i>in amputazione...</i>	
Tipo di distacco	totale	parziale
Sede del danno	degli arti	delle dita

AMPUTAZIONE DI UN ARTO

Primo soccorso

- chiamare il 118
- arrestare l'emorragia
 - con il **laccio emostatico**, proteggendosi con **guanti monouso** e **visiera paraschizzi**
- tenere il ferito in **posizione antishock**, avvolto dalla **coperta isotermica**, fino all'arrivo del 118
- **recuperare la parte amputata**, rimuovere lo sporco con sciacqui d'acqua o di soluzione fisiologica, medicandola con garze sterili inumidite e fasciandola
- portarla in ospedale in contenitore contenente ghiaccio, evitando che il pezzo sia a contatto diretto con il ghiaccio



AMPUTAZIONE DELLE DITA

Primo soccorso

- chiama il 118
- indossa i guanti, ed esegui la compressione diretta del moncone sanguinante
- ridotto il sanguinamento, medica e fascia la ferita con un tamponamento compressivo
- recupera il segmento amputato,
 - sciacquarlo con acqua o soluzione fisiologica senza disinfettarlo per rimuovere lo sporco
 - medicarlo con garze sterili inumidite e conservarlo in un contenitore refrigerato
- trasporta infermo e frammento in ospedale



EMORRAGIE

Classificazione

Sede di

Affluenza

- **emorragie esterne**
- **e. interne**
- **e. esteriorizzare**

Provenienza

- **emorragie arteriose**
- **emorragie venose**
- **emorragie capillari**

Emorragie esterne

- perdita di sangue all'esterno dell'organismo

Emorragie interne

- versamenti di sangue confinati all'interno del corpo

Emorragie esteriorizzate

- emorragie che avvengono all'interno di cavità collegate con l'esterno (tubo digerente, vie respiratorie, vie urinarie, orecchio, naso)

EMORRAGIE ARTERIOSE

- ✘ fuoriuscita di sangue dalle arterie
- ✘ il sangue *zampilla*
 - ✘ fuoriesce a fiotti intermittenti in maniera sincrona con i battiti del cuore
 - ✘ sprizza lontano della lesione
- ✘ bordi della ferita puliti
- ✘ sanguinamento imponente con rapido dissanguamento

EMORRAGIE VENOSE

Fuoriuscita di sangue dalle vene

- ✘ il sangue *scorre* (sgorga lentamente con flusso costante)
- ✘ bordi della ferita sporchi

Emorragie Capillari

Fuoriuscita di sangue dai capillari

- il sangue fuoriesce in piccole quantità, lentamente
- non sono mai gravi


EMORRAGIE ESTERNE

Primo Soccorso

Pressione diretta sul
punto di lesione




applicazione
laccio
emostatico



Sollevamento
(di un arto)



Compressione
arteria a monte



EMORRAGIE INTERNE

Primo Soccorso

Nel sospetto di emorragia interna, chiamare il 118 e -
in attesa - trattare lo shock emorragico

- distendendo il paziente in *posizione antishock*
- coprendolo con la coperta isotermica
- impedendogli di bere, anche se ha sete

EMORRAGIE ESTERIORIZZATE

Primo Soccorso

Il tema verrà illustrato nel modulo C

ANNEGAMENTO

Primo soccorso

- ✘ dopo avere chiamato aiuto, rimuovi la vittima dall'acqua utilizzando ogni mezzo
- ✘ condotta la vittima a riva (o su una barca), controlla coscienza e respiro
- ✘ avvia, se del caso le manovre di rianimazione, dopo avere chiamato il 118
- ✘ **non tentare manovre di soccorso in acqua se non si ha a disposizione un materassino, una barca ecc.**